

PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Castorex NEO injekčná suspenzia pre králiky

2. ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA (LÁTKY) A INÉ ZLOŽKY

Každá dávka (0,5 ml) obsahuje:

Účinná látka:

Inaktivovaný vírus hemoragickej choroby králikov typ 2, kmeň RHDV2 F/12B
min. 0,300 O.D.*

Adjuvans:

Gél hydroxidu hlinitého max. 1,5 mg

Pomocné látky:

Formaldehyd max. 0,25 mg

Thiomersal max. 0,06 mg

* ELISA optická denzita v sérach králikov po vakcinácii

Suspenzia červeno-hnedej farby, ktorej státním sa vytvorí ľahko roztrepatel'ný sediment inaktivovaného RHDV2 adsorbovaného na gél hydroxidu hlinitého, ktorý predstavuje 40-60% vakcíny.

3. INDIKÁCIA(-E)

Na aktívnu imunizáciu králikov na zabránenie mortality spôsobenej RHD vírusom typ 2.

Nástup imunity: 7 dní

Trvanie imunity: 1 rok

4. CIEĽOVÝ DRUH

Králik.

5. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Vakcinačná dávka pre všetky vekové kategórie je 0,5 ml.

1 dávka 0,5 ml na kráľika sa aplikuje subkutánne na laterálnu stranu hrudníka podľa nasledujúceho plánu:

Prvá vakcinácia:

1 injekcia od veku 6 týždňov.

Vzhľadom na epizootologickú situáciu je možné vakcinovať kráľiky od 4 týždňov veku s následnou revakcináciou 4 týždne po prvej injekcii.

Revakcinácia:

1 injekcia každých 12 mesiacov

6. EXSPIRAČNÁ DOBA

2 roky